

Variedad de polinización libre.

Ciclo vegetativo: Precoz.

Fecha de siembra: Para temporal: 25 de abril al 30 de mayo.

Densidad de población: 65 mil plantas/ha Densidad de siembra: 25 kg de semilla/ha

Altura de planta: 2.50 m

Color de grano: Blanco cristalino.

Rendimiento: 5.0 ton/ha

## Áreas de adaptación

Valles altos de 2,400 a 2,700 msnm, en los municipios del Valle de Toluca, Atlacomulco y Jilotepec. Valle de México de 2,200 a 2,400 msnm en la región de Zumpango.







# Un campo

# Mexiquense más productivo

### Recomendaciones

Preparación del suelo: Realizar un paso de rastra, un barbecho y un segundo paso de rastra. Si es necesario; realizar un subsoleo.

Muestreo del suelo: Realizar un análisis de fertilidad del suelo, previo a la siembra

Fertilización por hectárea: Aplicar la fórmula 115-69-30 la cual debe de ser complementada a la interpretación del análisis previo de la fertilidad del suelo. La distribución será de la siguiente manera: en la siembra aplicar la mezcla de 100 kg de urea, 150 kg de superfosfato de calcio triple y 50 kg de cloruro de potasio. En la segunda escarda aplicar 150 kg de urea.

#### Control de plagas y malezas:

Plaga	Nombre común	Nombre comercial	Formulación	Dosis/ha
	TRATA	AMIENTO AL SUELO	**	100
Plagas rizofagas:	Teflutrina	Force 2 G	2% granulado	15-20 kg
	Tebupirimphos	Azteca	2% granulado	10-12 kg
	Terbufos	Counter FC 15%	15% granulado	7 kg
		Counter FC 5%	5% granulado	20 kg
		Derbus 5%	5% granulado	20 kg
	Clorpirifos etil	Lorsban 3 G	3% granulado	15-25 kg
	Diazinón	Velsidol 5 G	5% granulado	20-25 kg
		Hércules 5 G	5% granulado	20-25 kg

Nombre comercial Nombre común Dosis/ha 0.350-0.500 L 0.70-1.0 kg Araña roja Ometoato Folimat LM 70 Barrenador del tallo Bacillus thuringiensis Dipel, Xentari Frailecillo Carbarilo Sevin 80% P.H 1.5-2.5 kg Clorpirifos etil Lorsban 480 FM 0.5-1.5 L

Gusano cogollero Gusano soldado Deltametrina Decis forte 0.150 L 0.300-0.500 L 300-350 g Gusano elotero Lambda - cyalotrina Karate Zeon 5 CS Picudo Metomilo Nudrín 90 Pulgón Pirimicarb Pirimor 50 WG 200-500 g Zeta - cipermet Arrivo plus 0 150-0 400

Nombre comun	comercial	controla	aplicación**	Dosis/na
Metolaclor + Atrazina + Mesotrione	Lumax	Hoja ancha y angosta	Pre al cultivo y a la maleza	4-6L
Atrazina + Metolaclor	Primagram Gold	Hoja ancha y angosta	Pre al cultivo y a la maleza	4-6L
Dimetenamida + Atrazina	Guardsman 2X	Hoja ancha y angosta	Pre al cultivo y a la maleza	3 - 4 L
Acetoclor + Atrazina	Keystone	Hoja ancha y angosta	Pre al cultivo y a la maleza	2.5 - 4.5 L
Dicamba + Atrazina	Marvel	Hoja ancha	Post al cultivo y a la maleza	2 - 3 L
Dicamba + Acido 2,4 - D Amina	Banvel 12 - 24	Hoja ancha	Post al cultivo y a la maleza	1 L
Dimetenamida	Frontier 2X	Hoja ancha y angosta	Pre al cultivo y a la maleza	1 - 1.25 L
Acetoclor	Harness	Hoja ancha y angosta	Pre al cultivo y a la maleza	1.5 - 2.5 L
Nicosulfurón	Sansón	Hoja ancha y angosta	Post al cultivo y a la maleza	50 - 70 g
Rimsulfurón	Titus	Hoja ancha y angosta	Post al cultivo y a la maleza	50 g
Carfentrazone etil	Focus	Hoja ancha	Post al cultivo y a la maleza	0.75-1.25 L
Thifensulfurón metil	Harmony	Hoja ancha	Post a la maleza	20 - 25 g
Atrazina	Gesaprim Cal. 90	Hoja ancha	Pre y Post al cultivo y a la maleza	1.5 - 2.5 kg
Acido 2,4 - D Amina	Hierbamina	Hoja ancha	Post al cultivo y a la maleza	1-2L

Cosecha manual: Cuando se presente la capa negra en la base del grano. Cosecha mecánica: Cuando el grano tenga de 16 a 18% de humedad. Uso: Para grano.